



GEFLÜGELPESTAUSBRUCH VERHINDERN!

Schützen Sie Ihren Geflügelbestand durch konsequente
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen!

BETRIEBS-/STALLMANAGEMENT

- ✓ Personal sollte nur eine Farm betreiben
- ✓ Betriebsflächen auf dem Hof regelmäßig reinigen und desinfizieren
- ✓ Futterreste unter dem Silo und Wasseransammlungen auf dem Hof sofort beseitigen
- ✓ Konsequente Schädnerbekämpfung durchführen
- ✓ Bei starkem Wind muss die Wetterseite der Ställe geschlossen werden

HYGIENESCHLEUSE

- ✓ Hygieneschleuse regelmäßig nass reinigen und desinfizieren
- ✓ An der Hofeinfahrt: Betriebseigenen Overall und Stiefel anziehen
- ✓ Im Vorraum des Stalls: Schuhwerk wechseln (für jeden Stall eigene Stiefel), Hände waschen und desinfizieren
- ✓ In jedem Stallvorraum eine Desinfektionsmatte/-wanne vorhalten
- ✓ Desinfektionsmittel regelmäßig erneuern
- ✓ Haustiere dürfen keinen Zugang zu den Vorräumen haben

EINSTREUMANAGEMENT

- ✓ In Zeiten erhöhten Eintragsrisikos (Stallpflicht) nur Stroh verwenden, welches zuvor 42 Tage gelagert wurde
- ✓ Streumaschinen sollten nicht überbetrieblich verwendet werden
- ✓ Ist dies jedoch notwendig, so muss der jeweils abgebende Betrieb die Streumaschine reinigen und desinfizieren
- ✓ Vor Befahren des Stalls: Geräteteile mit Bodenkontakt reinigen und desinfizieren

KADAVERBESEITIGUNG

- ✓ Kadaver dürfen nicht über die Hygieneschleuse aus dem Stall verbracht werden, sondern über Seitentüren/Klappe in der Stallwand
- ✓ Kadaver erst außerhalb des Stalls in ein Transportfahrzeug (z.B. geschlossene Schubkarre) einladen und zur Kadavertonne transportieren; nicht mit dem Transportfahrzeug für Kadaver den Stall befahren
- ✓ Kadavertonne muss nach jeder Abholung gereinigt und desinfiziert werden
- ✓ Kadaver dürfen nicht über öffentliche Wege transportiert werden